

가을철 구제역 예방에 철저를 기합시다.

중국 등 주변국가의 구제역 발생과 명절·휴가철 사람 이동이 많아짐에 따라
가을철 구제역의 국내 유입 가능성이 높습니다.
구제역 발생국 여행을 자제하고 농장 차단방역·소독 활동을 강화합시다.



구제역 유입 및 재발 방지를 위한 축산농가 및 관계자 예방수칙

해외여행

해외여행 자제



구제역 발생국(지역)
여행을 자제 합니다.

입국 신고 및 소독



발생국(지역)을 여행하는 경우
입국 시 공항만 검역관에게 신고합니다.

입국 후 5일간 농장출입 금지



입국 후에는 최소 5일간
농장 출입을 하지 않습니다.

농장소독·신고

농장내·외부 주1회 이상 소독/예찰



농장소독·예찰은
주기적으로 실시합니다.

철저한 차단방역



외부인, 차량의 농장
출입을 통제합니다.

의심축 조기신고



의심축 발생시
신속히 신고합니다.

구제역 발생국(지역)은 검역원 홈페이지(www.nvrqs.go.kr)에서 확인하고,
구제역 의심축 발견 시 1588-4060/9060, 1666-0682로 즉시 신고하세요

구제역 의심축 발견 즉시

1588-4060/9060, 1666-0682로 신고합시다!

신고에 따른 살처분시에는 100% 시가 보상

신고를 하지 않거나 이동 제한 명령을 위반하면 처벌을 받음(1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금)




소 임상증상 및 육안병변



*거품 섞인 침흘림



*혀에 생긴 궤양(상처)




*유두에 생긴 백색의 수포와 수포 파열후의 가피 형성



*앞발굽 사이의 수포 형성과 뒷발굽 사이의 궤양과 가피




돼지 임상증상 및 육안병변



*귓등에 생긴 수포(물집)



*수포가 터져 돼지의 혀에 생긴 궤양



*유방에 생긴 수포 및 파열로 인한 상피탈락



*발굽 사이의 수포, 궤양

구분	감염초기의 임상증상	구제역 발병증상
소	• 유량 감소 • 식욕 부진 • 의기 소침 • 발열	• 수포형성(혀, 유두, 앞발굽, 뒷발굽 등) • 거품섞인 침흘림 • 가피(딱지) 형성
돼지	• 파행 • 식욕 부진 • 의기 소침 • 발열	• 수포형성(귓등, 유방, 혀, 발굽 등) • 만지면 고통스러워 함 • 발굽에 흰색띠 형성