

15. 임신 중 태아의 발육은?

■ 임신 초기(수정에서부터 3개월까지는) 유산의 가능성이 있으므로 과격한 운동을 피합니다.

임신 초기 3~4개월까지는 외부 충격방지에 특히 조심해야 하며, 임신 6개월까지는 태아의 발육이 미미한 상태입니다.

■ 임신 말기(수정 후 7개월에서 분만 시까지)는 태아가 급격한 성장을 하는 시기로 분만 직전에 농후 사료량을 약 20~30%가량 증량 급여하여 전체 TDN가를 높여줍니다.

임신 7개월부터는 태아의 발육이 활발해지고, 체중도 무거워지므로 태동도 알 수 있게 됩니다. 태아의 성장 속도가 빠르므로 사료도 증량 급여하여, 영양보충을 해 주는 것이 중요합니다.

■ 임신 초기에서 중기까지는 신체총실지수(BCS) 2.5, 임신 말기에는 BCS를 3.0이 되도록 합니다.

〈임신기간과 태아의 발육〉

연령 (일)	태아의 크기		연령 (일)	태아의 크기	
	체중(kg)	체장(cm)		체중(kg)	체장(cm)
30	0.28(g)	1.2	180	4~7	50~61
60	7.1~14.1(g)	6.4	210	9~14	61~71
90	85~170(g)	12.7~15.2	240	18~27	71~81
120	450~907	25~30	270	27~45	81~96
150	2~3	30~40			

(낙농과 / 041-580-3381)