

28. 내·외부 기생충 구충 요령은?

소에서 기생충은 장기 내부에 기생하는 내부기생충과 가축의 체표 외부에 기생하는 외부기생충으로 나눌 수 있습니다.

내부기생충은 회충, 편충, 요충, 장결정충 등의 연충류가 외부 기생충은 모기, 이, 벼룩 같은 곤충류와 진드기 같은 거미류가 있습니다.

기생충에 감염되면 성장지연, 우유 생산 감소, 면역 및 사료 효율 저하를 초래 할 수 있으므로 예방적 차원의 정기적인 구충이 필요합니다.

기생충 구제를 위해서는 우군 전체에 광범위한 구충을 정기적으로 실시해야 하며, 방목 시 진드기 예방을 위해 약제를 살포하는것도 도움이 됩니다.

송아지의 경우 생후 1개월 이내, 외부 구입우의 경우 구입 후 1주일 이내 광범위 구충제를 먹이거나 주사 또는 피부에 뿌려 구충을 실시하여야 합니다. 미경산우 및 착유우는 잔류 문제를 해결하기 위하여 분만 1~2전에 구제해야 합니다.

일반적으로 내부 구충을 위해선 알벤다졸 등 내부구충제를 급여하고, 내외부 구충을 위해서는 이보 맥 제제 등을 등에 뿌리거나 먹이는 방식으로 투여합니다. 특히 구충제의 각 성분별로 구제할 수 있는 기생충의 범위와 투여 방법, 투여 시 유의사항이 다르므로 제품설명서를 참고하여 올바르게 사용해야 합니다.

(가축질병방역과 / 063-238-7233)